

**EL PRIMER MEDICAMENTO  
DE SU TIPO APROBADO  
POR LA FDA\* PARA EL  
TRATAMIENTO DE ADULTOS  
CON HIDRADENITIS  
SUPURATIVA (HS) DE  
MODERADA A GRAVE**

Representación del paciente.

\*COSENTYX actúa sobre la IL-17A, una molécula que se cree que desempeña un papel en la inflamación que puede contribuir a los síntomas de la HS, y la bloquea.

### INDICACIONES

COSENTYX<sup>®</sup> es un medicamento recetado que se utiliza para tratar:

- personas de 6 años o más con psoriasis en placas (plaque psoriasis, PsO) de moderada a grave que afecta áreas grandes o numerosas del cuerpo, y quienes podrían beneficiarse de las inyecciones o de tomar comprimidos (terapia sistémica), o de la fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta [o UV], solo o con terapia sistémica);
- personas de 2 años o más con artritis psoriásica (psoriatic arthritis, PsA) activa;
- adultos con espondilitis anquilosante (AS) activa;
- adultos con espondiloartritis axial no radiográfica activa (non-radiographic axial spondyloarthritis, nr-axSpA) y signos objetivos de inflamación;
- personas de 4 años o más con artritis relacionada con entesitis activa (enthesitis-related arthritis, ERA);
- adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use COSENTYX si ha tenido una reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía del medicamento.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.

## SE HA DEMOSTRADO QUE COSENTYX<sup>®</sup> FUNCIONA DE MANERA DIFERENTE

COSENTYX se dirige a IL-17A,\* una molécula que se cree que desempeña un papel en la inflamación que puede conducir a los síntomas de la hidradenitis supurativa (HS).

Antes de que la FDA aprobara COSENTYX para el tratamiento de la hidradenitis supurativa en adultos con HS de moderada a grave, se habían surtido **más de 3.7 millones de recetas** de COSENTYX<sup>†</sup> en los Estados Unidos.<sup>‡</sup>

**TRATAR LA HS DESDE ADENTRO HACIA AFUERA.**  
Hable con su dermatólogo para ver si COSENTYX puede ser adecuado para usted.

\* Se desconoce la relación entre cómo actúa COSENTYX en el cuerpo y cómo afecta sus síntomas.

<sup>†</sup>A partir de marzo de 2023.

<sup>‡</sup>En todas las indicaciones, sin incluir HS.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) ¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. COSENTYX podría aumentar el riesgo de que tenga efectos secundarios serios, como:

#### Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraer infecciones. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

- Su médico debe realizarle pruebas de tuberculosis (TB) antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.
- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.

## ¿QUÉ ES LA HIDRADENITIS SUPURATIVA (HS)?

Si bien se desconoce la causa exacta, se cree que los síntomas de la HS comienzan con un folículo piloso bloqueado que desencadena el sistema inmunitario y produce demasiadas moléculas inflamatorias, como la IL-17A. En las personas con HS, se cree que un sistema inmunitario hiperactivo y demasiada IL-17A contribuyen al exceso de inflamación en el cuerpo que puede causar protuberancias y abscesos que pueden doler.

**EN LA HS, SE CREE QUE UN SISTEMA INMUNITARIO HIPERACTIVO ATACA LOS FOLÍCULOS PILOSOS BLOQUEADOS.**


La inflamación puede hacer que los folículos pilosos se bloqueen y se agranden.

## LA HS PUEDE PASARLE A CASI CUALQUIER PERSONA

**NO ES CONTAGIOSA NI SE DEBE A UNA HIGIENE DEFICIENTE.**

- Una de cada 100 personas puede verse afectada por la HS.
- La HS generalmente comienza cuando las personas tienen alrededor de 20 años.
- La HS es más frecuente en las mujeres y afecta a las personas de color de manera desproporcionada.
- Otros factores que pueden contribuir al empeoramiento de los síntomas de la HS incluyen el peso o el tabaquismo.

Los folículos pilosos bloqueados y agrandados pueden romperse y causar protuberancias dolorosas y abscesos similares a furúnculos.



Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).




## LA HS PUEDE SENTIRSE COMO SI TOMARA EL CONTROL

Vivir con hidradenitis supurativa (HS) puede ser un viaje largo y frustrante. A menudo, lidiar con los síntomas dolorosos de la HS puede hacer que las actividades cotidianas sean un desafío.

Los signos y síntomas de la HS pueden incluir protuberancias o abscesos dolorosos, principalmente en áreas donde la piel roza contra la piel, como las axilas, la zona inguinal, los muslos internos, las nalgas y debajo de los senos. Los abscesos de HS pueden drenar y pueden provocar túneles que pueden dejar cicatrices.

### SITIOS DONDE LOS SÍNTOMAS DE LA HS APARECEN COMÚNMENTE:



## CÓMO PUEDE PROGRESAR LA HS

Con el tiempo, la HS puede progresar o empeorar si no se trata, y puede provocar cicatrices; por eso es importante comprender más sobre la HS.

### LA HS PUEDE CLASIFICARSE EN 3 ETAPAS\* SEGÚN LA GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS:



**LEVE**<sup>†</sup>: cuando hay 1 protuberancia o múltiples protuberancias inflamatorias y abscesos, sin cicatrices ni formación de túnel (tracto sinusal).



**MODERADA**: cuando hay múltiples abscesos, junto con túneles limitados o cicatrices.



**GRAVE**: cuando hay múltiples o extensos túneles interconectados, abscesos y cicatrices.

Todas las imágenes se utilizan con permiso de ©DermNet NZ

\*Al clasificar la gravedad de su condición, su dermatólogo puede denominar a estas etapas como etapas de Hurley.

<sup>†</sup>COSENTYX está aprobado para tratar la HS de moderada a grave.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de comenzar COSENTYX<sup>®</sup>, informe a su médico si:

- está en tratamiento por una infección;
- tiene una infección que no se cura o que reaparece;
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).



## COSENTYX® ES EL PRIMER MEDICAMENTO DE SU TIPO APROBADO POR LA FDA PARA EL TRATAMIENTO DE ADULTOS CON HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) DE MODERADA A GRAVE

### ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA COSENTYX?

COSENTYX actúa sobre la IL-17A,\* una molécula que se cree que desempeña un papel en la inflamación que puede contribuir a los síntomas de la HS. Un cierto nivel de IL-17A es normal, pero cuando tiene HS, una inflamación excesiva puede provocar síntomas como protuberancias y abscesos que pueden ser dolorosos.

COSENTYX es un medicamento biológico basado en proteínas que se produce a partir de fuentes vivas y se administra mediante inyección.

\*No se conoce completamente la relación entre la forma en que COSENTYX actúa en el cuerpo y cómo afecta los síntomas de la HS.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA VER CÓMO COSENTYX TRATA LA HS DESDE ADENTRO HACIA AFUERA.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

#### Antes de comenzar COSENTYX®, informe a su médico si:

- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como los siguientes: fiebre, sudoración o escalofríos; dolores musculares; tos; dificultad para respirar; sangre en el esputo; pérdida de peso; piel caliente, enrojecida o adolorida o úlceras en el cuerpo; diarrea o dolor de estómago; ardor al orinar u orinar con mayor frecuencia que lo normal

Después de que empiece a tomar COSENTYX, llame inmediatamente al médico si tiene cualquiera de los signos de infección mencionados en la página 7 y anteriormente. No use COSENTYX si tiene algún síntoma de infección, a menos que se lo indique el médico.

## EXPERIENCIA COMPROBADA

COSENTYX ha tenido un perfil de seguridad bien estudiado desde su lanzamiento en 2015 y ha sido aprobado para tratar numerosas afecciones:

**2015:** adultos con psoriasis en placas moderada a grave

**2016:** adultos con artritis psoriásica activa y con espondilitis anquilosante activa

**2020:** adultos con espondiloartritis axial no radiográfica activa

**2021:** niños con psoriasis en placas (6 años o más), artritis psoriásica (2 años o más) y artritis relacionada con entesitis (4 años o más)

**2023:** adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave



Representación del paciente.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.

## ENCONTRAR UN ALIVIO REAL DE LOS SÍNTOMAS DE LA HS

Se ha demostrado que COSENTYX<sup>®</sup> ayuda a los adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave **A ENCONTRAR ALIVIO** a las **16 SEMANAS.\***



### REDUCCIÓN

Reducción de al menos un 50 % en la cantidad de protuberancias inflamatorias y abscesos.



### SIN AUMENTO

en la cantidad de abscesos o túneles de drenaje.

En los 2 ensayos clínicos, el 41 % y el 43 % de los adultos que tomaron COSENTYX\* tuvieron una reducción de al menos el 50 % en la cantidad de protuberancias inflamatorias y abscesos, sin aumento en la cantidad de abscesos o túneles de drenaje a las 16 semanas frente al 29 % y el 26 % que tomaron placebo.

\*COSENTYX 300 mg cada 4 semanas (después de 5 dosis semanales iniciales).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de COSENTYX?

**COSENTYX podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

#### Reacciones alérgicas graves

Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias. Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente si tiene alguno de los síntomas siguientes: sensación de desmayo; hinchazón en la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o sensación de opresión en la garganta o en el pecho; o erupción cutánea o urticaria (protuberancias rojas y con picazón).

**Si tiene una reacción alérgica grave, no se aplique otra inyección de COSENTYX.**

#### Enfermedad intestinal inflamatoria

Pueden ocurrir nuevos casos o "exacerbaciones" de la enfermedad intestinal inflamatoria con COSENTYX y a veces pueden ser graves. Si tiene enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), informe al médico si experimenta síntomas de empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento con COSENTYX o si aparecen nuevos síntomas de dolor estomacal o diarrea.



Representación del paciente.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.  
Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.



## COSENTYX® PUEDE AYUDAR A REDUCIR LAS EXACERBACIONES DE LA HS



**EN 1 DE 2 ENSAYOS CLÍNICOS, EL 75 % DE LOS ADULTOS QUE TOMARON COSENTYX NO TUVIERON EXACERBACIONES EN LA SEMANA 16.**

En el mismo ensayo clínico, el 25 % de los adultos que tomaron COSENTYX\* tuvieron 1 o más exacerbaciones en la semana 16 frente al 36 % que tomó placebo.

**En el segundo ensayo, no se observaron los mismos resultados.**

Una exacerbación se definió como un aumento superior al 25 % en la cantidad de protuberancias y abscesos inflamatorios, con un aumento mínimo de 2 protuberancias o abscesos inflamatorios.

\*COSENTYX 300 mg cada 4 semanas (después de 5 dosis semanales iniciales).

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE** (continuación)  
**Durante el tratamiento con COSENTYX, pueden producirse reacciones cutáneas graves que se parecen al eccema,** desde días hasta meses después de la primera dosis, y a veces pueden derivar en hospitalización. Su médico puede interrumpir temporalmente el tratamiento con COSENTYX si usted desarrolla reacciones cutáneas graves. Infórmele a su médico si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas: enrojecimiento o erupción cutánea, picazón, pequeñas protuberancias o parches, sequedad de la piel que se siente como cuero, ampollas en las manos o los pies que supuran o se vuelven escamosas, o descamación de la piel.

**Los efectos secundarios más frecuentes de COSENTYX incluyen:** síntomas de resfrío, diarrea e infecciones de las vías respiratorias superiores.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de COSENTYX. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

**Antes de comenzar COSENTYX, informe al médico si:**

- Tiene alguna de las afecciones o síntomas de infección mencionados anteriormente.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Es alérgico al látex. Las tapas de las agujas de la pluma Sensoready® de COSENTYX y de las jeringas precargadas de 150 mg/ml y 75 mg/0,5 ml contienen látex.



Representación del paciente.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.



## AL AÑO DE TRATAMIENTO\*

La información de 1 año presentada aquí son **datos exploratorios†** y se desconoce si la mejoría de los síntomas se debió a COSENTYX® o no. Cada persona experimenta el tratamiento de manera diferente, por lo que los resultados pueden variar.

### PROTUBERANCIAS Y ABSCESOS AL AÑO

En los 2 ensayos clínicos, al año, el 58 % y el 65 % (56 de 96, 61 de 94 pacientes, respectivamente) tuvieron una reducción de al menos el 50 % en la cantidad de protuberancias inflamatorias y abscesos, sin aumento en la cantidad de abscesos o túneles de drenaje.

### EXACERBACIONES AL AÑO

Al año, el 72 % y el 74 % (78 de 109 y 75 de 102 pacientes, respectivamente) no experimentaron una exacerbación. En los ensayos clínicos, una exacerbación se definió como un aumento superior al 25 % en la cantidad de protuberancias y abscesos inflamatorios, con un aumento mínimo de 2 protuberancias o abscesos inflamatorios.

\*COSENTYX 300 mg cada 4 semanas (después de 5 dosis semanales iniciales).

†No podemos sacar conclusiones a partir de datos exploratorios, pero es útil para ayudar a guiar investigaciones futuras.

**HABLE CON SU DERMATÓLOGO SOBRE SUS OBJETIVOS DE TRATAMIENTO, INCLUIDOS LAS PROTUBERANCIAS, LAS EXACERBACIONES Y EL DOLOR EN LA PIEL.**

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- Ha recibido recientemente o está por recibir una inmunización (vacuna). Las personas tratadas con COSENTYX **no deben** recibir vacunas elaboradas con virus vivos. Los niños deben estar al día con todas las vacunas antes de comenzar a recibir COSENTYX.
- Tiene cualquier otra afección médica y todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Elabore una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le den un medicamento nuevo.



Representación del paciente.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si COSENTYX puede dañar al bebé en gestación. Usted y el médico deben decidir si usará COSENTYX.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si COSENTYX pasa a la leche materna.

Se aconseja que se informe a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

## ADMINISTRACIÓN CONVENIENTE

La dosis recomendada de COSENTYX® para hidradenitis supurativa (HS) es de 300 mg.\* Si su médico determina que usted o un cuidador pueden administrarse las inyecciones en casa, debería recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar COSENTYX. No trate de inyectarse COSENTYX hasta que su médico les haya mostrado a usted o a su cuidador cómo hacerlo.

### CÓMO COMENZAR A RECIBIR COSENTYX:

Una vez por semana durante 5 semanas.



### MANTENERSE CON COSENTYX:

Una vez cada 4 semanas. Si continúa teniendo síntomas de HS, su dermatólogo puede recetarle COSENTYX cada 2 semanas.



\*Cada dosis de 300 mg se administra como 1 inyección de 300 mg o 2 inyecciones de 150 mg debajo de la piel.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use COSENTYX si ha tenido una reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía del medicamento.

### ¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. COSENTYX podría aumentar el riesgo de que tenga efectos secundarios serios, como:

#### Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraer infecciones. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

## SIÉNTASE CÓMODO AL TOMAR COSENTYX

La pluma UnoReady® de 300 mg es fácil de usar y tiene una calificación de satisfacción del 100 %.\*

- La mayoría de las personas no experimenta dolor con la inyección†
- La tapa no está hecha con látex de caucho natural



\*Basado en un estudio en el que los 37 participantes que usaron la pluma UnoReady informaron estar satisfechos o muy satisfechos con el dispositivo a las 28 semanas para pacientes con síntomas de PsO de moderada a grave.

†En función de un estudio en el que 30 de 38 participantes que usaron la pluma UnoReady no informaron dolor con la inyección a las 12 semanas.

Consulte las "Instrucciones de uso" detalladas que se incluyen con COSENTYX para obtener información sobre cómo preparar e inyectarse una dosis de COSENTYX, y cómo tirar (desechar) adecuadamente COSENTYX.



**OBSERVE CÓMO INYECTARSE CON  
LA PLUMA UNOREADY® Y OTROS  
RECURSOS DE INYECCIÓN**

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- Su médico debe realizarle pruebas de tuberculosis (TB) antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.
- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.

## APOYO REAL. SOLUCIONES PERSONALES.

**COSENTYX® Connect es un programa de apoyo gratuito** que se adapta a sus necesidades desde el principio. Esto es lo que obtendrá una vez que se inscriba:



**Equipo dedicado de COSENTYX® Connect para ayudarlo a comenzar**



**Copago desde tan solo \$0\***

Para pacientes elegibles con seguro privado. Se aplican limitaciones.

CUBIERTO  
hasta que esté  
CUBIERTO

**Hasta 2 años de COSENTYX gratis** con el Programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que está cubierto)<sup>†</sup> si se rechaza su cobertura de seguro



**Ayuda para orientarse sobre la cobertura del seguro**



**Recursos personalizados** por correo postal o correo electrónico y actualizaciones por mensaje de texto



**Recursos de capacitación sobre inyecciones**

\*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

Para inscribirse en el Programa de Apoyo de COSENTYX® Connect y comenzar a recibir estos recursos gratuitos, llámenos al **1-844-COSENTYX (1-844-267-3689)** o visite **COSENTYX.com**.

Para obtener más detalles, consulte la página siguiente.

## CÓMO COMENZAR A RECIBIR COSENTYX

Su lista de verificación de COSENTYX® Connect hace que el proceso de comenzar a usar COSENTYX sea tan simple como contar hasta 4.



**ESCANEE ESTE CÓDIGO PARA USAR UNA LISTA DE VERIFICACIÓN AL COMENZAR A USAR COSENTYX**



Representación del paciente.

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción** completa, incluida la **Guía de medicamentos**.

Visite **COSENTYX.com** para obtener más información.



## CÓMO OBTENER AYUDA PARA ORIENTARSE SOBRE LA COBERTURA DEL SEGURO

Su equipo de COSENTYX® Connect trabajará con usted y su proveedor de atención médica para obtener la aprobación de su receta de COSENTYX® (secukinumab).



Puede ser elegible para ahorrar en sus costos de bolsillo de medicamentos recetados todos los meses.\*

## CÓMO OBTENER ASISTENCIA FINANCIERA

Puede ser elegible para nuestra **oferta de copago\*** si tiene un seguro privado. En 2022, el 94 % de los pacientes que utilizaron el programa pagaron \$0 de su bolsillo.

En el caso poco probable de que su cobertura sea rechazada, haremos todo lo posible para ayudarlo. Obtenga más información sobre nuestro Programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que está cubierto).<sup>†</sup> El programa ofrece hasta 2 años de COSENTYX gratis si su cobertura no se aprueba inicialmente.

Para obtener más asistencia con la cobertura, visite [COSENTYX.com/how-to-get-cosentyx](https://www.cosentyx.com/how-to-get-cosentyx) para ver un recorrido completo de los pasos para obtener COSENTYX.

## RECIBIR COSENTYX

Se le envía COSENTYX desde una farmacia especializada, ya que es un medicamento biológico, lo que significa que requiere un manejo especial y debe refrigerarse.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO COSENTYX® CONNECT PUEDE AYUDAR

## COMPARTA SU HISTORIA

Si está tomando COSENTYX para alguna de sus indicaciones aprobadas por la FDA y desea ayudar a otras personas, comparta su historia con nosotros. Después de hacerlo, un miembro de nuestro personal de Voces de inspiración se pondrá en contacto con usted.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA APRENDER CÓMO COMPARTIR SU HISTORIA A TRAVÉS DE VOCES DE INSPIRACIÓN

O visite [COSENTYX.com/hidradenitis-suppurativa/share-treatment-story](https://www.cosentyx.com/hidradenitis-suppurativa/share-treatment-story).

\*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

<sup>†</sup>El Programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que está cubierto) está disponible solo para inyección subcutánea de COSENTYX. Los pacientes elegibles deben contar con un seguro privado, una receta válida para COSENTYX y un rechazo de cobertura del seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de la cobertura en el transcurso de los 90 días de la inscripción para conservar la elegibilidad. El programa proporciona COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de la cobertura del seguro, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida de acuerdo con el etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para los pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados en forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otro programa federal o estatal. Es posible que se les solicite a los pacientes que vuelvan a verificar el estado de la cobertura del seguro durante el programa. Sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico; la participación no es una garantía de cobertura del seguro. Se pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos que esperan la cobertura de COSENTYX después de dos años pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, cancelar o enmendar este programa sin aviso previo.


Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.

## COMIENZE LA CONVERSACIÓN CON UN DERMATÓLOGO

**Responda 5 preguntas simples** para ayudar a guiar su conversación y los objetivos de tratamiento con su médico. También le proporcionamos espacio para que escriba cualquier pregunta adicional.

**1. Encierre en un círculo las áreas donde tiene protuberancias o abscesos:**



**2. ¿Ha experimentado estos síntomas más de una vez en la misma área en un período de 6 meses?**

Sí     No

**3. ¿Qué síntomas experimenta con estos abscesos y protuberancias?**

Haga clic en todos los que correspondan.

Dolor     Hinchazón     Picazón

Fuga o drenaje de pus o sangre     Olor

Otro \_\_\_\_\_

**4. ¿Cuáles de sus actividades diarias se ven afectadas negativamente por su afección?**

Haga clic en todos los que correspondan.

Vestirse     Ir a trabajar

Hacer ejercicio     Hacer planes

Otro \_\_\_\_\_

**5. ¿Está satisfecho con su tratamiento actual?**

Sí     No

Actualmente no estoy tratando mi hidradenitis supurativa (HS)

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.



Representación del paciente.

**CONSULTE A SU DERMATÓLOGO ACERCA DE COSENTYX<sup>®</sup>.**



Visite [COSENTYX.com/hidradenitis-suppurativa](https://www.cosentyx.com/hidradenitis-suppurativa)



Síguenos en Instagram en:  
[@COSENTYX \(secukinumab\)](https://www.instagram.com/cosentyx)



Denos Me gusta en Facebook en  
[@COSENTYX \(secukinumab\)](https://www.facebook.com/cosentyx)



Encuéntrenos o síganos en TikTok  
[@COSENTYX \(secukinumab\)](https://www.tiktok.com/@cosentyx)

Consulte la información de seguridad importante adicional que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).



**Novartis Pharmaceuticals Corporation**  
East Hanover, Nueva Jersey 07936-1080



