

PARA ADULTOS CON ESPONDILOARTRITIS AXIAL NO RADIOGRÁFICA ACTIVA  
PARA ADULTOS CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE ACTIVA



**Cosentyx**<sup>®</sup>  
(secukinumab)

**OBSÉRVAME**



## **MOVERME Y SENTIRME MEJOR**

Este folleto contiene imágenes de **pacientes reales** a quienes se les administró COSENTYX<sup>®</sup> y que recibieron una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

### **INDICACIONES**

COSENTYX<sup>®</sup> (secukinumab) es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de:

- personas de 6 años o más con psoriasis en placas (PsO) de moderada a grave que afecta grandes o numerosas áreas del cuerpo, y quienes podrían beneficiarse de las inyecciones o de tomar comprimidos (terapia sistémica), o de la fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta [o UV], solo o con terapia sistémica);
- personas de 2 años o más con artritis psoriásica (PsA) activa;
- adultos con espondilitis anquilosante activa (AS);
- adultos con espondiloartritis axial no radiográfica activa (nr-axSpA) y signos objetivos de inflamación;
- personas de 4 años o más con artritis relacionada con entesitis activa (ERA);
- adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

No use COSENTYX si ha tenido una reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía de medicamentos.

**Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.**

**Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos.**

Visite **COSENTYX.com** para obtener más información.



Solo para uso de adultos.

## RESULTADOS REALES. ALIVIO REAL.

La mayoría de las personas que tomaron COSENTYX<sup>®</sup> no solo tuvieron menos dolor de espalda y rigidez matutina, sino que observaron una mejora en su capacidad de movimiento y se sintieron mejor en general.\*†

\*El 38 % de las personas con nr-axSpA a quienes se les administró COSENTYX frente al 19 % a quienes se les administró placebo a las 52 semanas.

†El 61 % de las personas con AS a quienes se les administró COSENTYX frente al 28 % a quienes se les administró placebo a las 16 semanas.

Un porcentaje similar de pacientes vio una mejoría a los 5 años.

Consulte la página 5 para obtener más información.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

#### ¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. COSENTYX podría aumentar el riesgo de que tenga efectos secundarios serios, como:

#### Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraer infecciones. Algunas personas han tenido infecciones graves mientras tomaban COSENTYX, incluida tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

- Su médico debe realizarle pruebas de TB antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.

## TOMAR EL CONTROL CON COSENTYX

La espondiloartritis axial (axSpA) puede no solo ser dolorosa, sino que puede afectar gravemente su vida diaria. Vivir con dolor de espalda y rigidez matutina puede ser un desafío.

#### La AxSpA incluye dos afecciones subdiagnosticadas:

- Espondiloartritis axial no radiográfica (nr-axSpA)
- Espondilitis anquilosante (AS)

En ambas afecciones, la inflamación en las articulaciones espinales puede causar dolor de espalda crónico, rigidez, fatiga y movilidad reducida. Si no se trata, esta inflamación puede causar daño irreversible.

Si tiene dificultades con el dolor de espalda y la movilidad reducida, tal vez sea momento de tomar el control. Siga leyendo para obtener más información. Luego, pregunte hoy mismo a su reumatólogo sobre COSENTYX<sup>®</sup>. COSENTYX es el primer medicamento de su tipo para la nr-axSpA y la AS dirigido a la IL-17A.

ACERCA DE COSENTYX <sup>®</sup> .....	5
NR-AXSPA Y AS .....	6
RESULTADOS .....	8
ADMINISTRACIÓN .....	12
APOYO .....	14

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.

## LUCHE CONTRA LA ESPONDILOARTRITIS AXIAL DE MANERA INNOVADORA

COSENTYX<sup>®</sup> **reduce los síntomas** de la axSpA (que incluye las afecciones de AS y nr-axSpA), como **dolor de espalda y rigidez matutina**.\*

COSENTYX está diseñado para dirigirse y bloquear la IL-17A, que es una de las muchas proteínas que pueden estar involucradas en provocar que el sistema inmunitario esté hiperactivo o ruidoso.

COSENTYX ayuda a "silenciar el ruido" en su sistema inmunitario y puede ayudarlo a sentirse mejor.

COSENTYX es el bloqueador de IL-17A aprobado por la FDA más recetado<sup>†</sup>.

\*Se desconoce la relación entre cómo actúa COSENTYX en el cuerpo y cómo afecta sus síntomas.

## ACERCA DE COSENTYX

COSENTYX se ha **estudiado ampliamente durante 17 años** en todas las indicaciones. COSENTYX fue aprobado por la FDA en 2015 para tratar a adultos con psoriasis en placas de moderada a grave. Luego, en 2016, fue aprobado por la FDA para tratar la espondilitis anquilosante activa y la artritis psoriásica activa. Más recientemente, en junio de 2020, fue aprobado por la FDA para tratar otra forma de axSpA: la nr-axSpA.



Lea más para ver por qué COSENTYX ya se ha **recetado a más de 4 millones de personas** en los Estados Unidos.<sup>†</sup>

<sup>†</sup>En todas las indicaciones.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

### Antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX, informe al médico si:

- está en tratamiento por una infección;
- tiene una infección que no se cura o que reaparece;
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB;
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como los siguientes: fiebre, sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos; dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel caliente, enrojecida o adolorida, o úlceras en el cuerpo; diarrea o dolor de estómago; ardor al orinar u orinar con mayor frecuencia que la normal

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.



Representación del paciente.

**ESCANEE EL CÓDIGO  
PARA OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO  
FUNCIONA COSENTYX.**



## COMPRENDER LA NR-AXSPA Y LA AS

La AxSpA incluye dos afecciones infradiagnosticadas: la nr-axSpA y la AS. En ambas afecciones, la inflamación en las articulaciones espinales puede causar dolor de espalda crónico, rigidez, fatiga y movilidad reducida. La Nr-axSpA puede considerarse una forma temprana de AS en algunos pacientes.


### nr-axSpA

- El daño espinal no aparecerá en una radiografía, pero puede aparecer en una RM
- Es más probable que los pacientes sean mujeres (50 %-60 %)
- La Nr-axSpA puede considerarse una forma temprana de AS en algunos pacientes

Hasta el 50 % de los pacientes con nr-axSpA están en riesgo de desarrollar AS.

### AS

- Se observará daño en la columna vertebral en una radiografía
- Es más probable que los pacientes sean hombres
- Daño articular y fusión espinal



**SEPA QUE HAY PACIENTES REALES QUE SE ESTÁN MOVIENDO DE NUEVO EN COSENTYX.com**

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Después de que empiece el tratamiento con COSENTYX, llame inmediatamente al médico si tiene cualquiera de los signos de infección mencionados antes. No use COSENTYX si tiene algún síntoma de infección, a menos que se lo indique el médico.

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de COSENTYX?

**COSENTYX podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

#### Reacciones alérgicas serias

Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias. Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente si tiene alguno de los síntomas siguientes: sensación de desmayo; hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o sensación de opresión en la garganta o en el pecho; o erupción cutánea o urticaria (protuberancias rojas y con comezón).

**Si tiene una reacción alérgica grave, no se aplique otra inyección de COSENTYX.**

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.

## MOVERSE Y SENTIRSE MEJOR

La mayoría de las personas que tomaron COSENTYX® no solo tuvieron menos dolor de espalda y rigidez matutina, sino que observaron una mejora en su capacidad de movimiento y se sintieron mejor en general.\*†

## RESULTADOS RÁPIDOS. ALIVIO QUE PUEDE DURAR.

### Manejar la nr-axSpA

**1**  
AÑO

**16**  
SEMANAS

Muchas personas que tomaron COSENTYX sintieron al menos una **mejora del 40 %** en los síntomas generales **al año**.\*† Muchos vieron resultados similares **en tan solo 16 semanas**.‡

\* El 38 % de las personas con nr-axSpA a quienes se les administró COSENTYX frente al 19 % a quienes se les administró placebo.

† Al año, se les informó a los pacientes y médicos qué medicamento se estaba usando, lo que puede afectar los resultados.

‡ El 41 % de las personas con nr-axSpA a quienes se les administró COSENTYX frente al 28 % a quienes se les administró placebo.

† El 61 % de las personas con AS a quienes se les administró COSENTYX frente al 28 % a quienes se les administró placebo.

### Manejar la AS

**16**  
SEMANAS

**5**  
AÑOS

El doble de personas tratadas con COSENTYX lograron una **mejoría** de al menos el **20 %** en los síntomas generales **en tan solo 16 semanas**.§ Muchos **siguieron sintiendo alivio a los 5 años**.†



Mark recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

“Puedo hacer cosas divertidas que antes no podía hacer”.

**MARK** PACIENTE REAL

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

#### Enfermedad intestinal inflamatoria

Pueden ocurrir nuevos casos o “exacerbaciones” de la enfermedad intestinal inflamatoria con COSENTYX y a veces pueden ser serios. Si tiene enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), informe al médico si experimenta síntomas de empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento con COSENTYX o si aparecen nuevos síntomas de dolor de estómago o diarrea.

Durante el tratamiento con COSENTYX, pueden producirse **reacciones cutáneas graves que se parecen al eczema**, desde días hasta meses después de la primera dosis, y a veces pueden derivar en una hospitalización. Su médico puede interrumpir temporalmente el tratamiento con COSENTYX si usted desarrolla reacciones cutáneas graves.

Consulte la **información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto**. Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos**.

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.

## COSENTYX PUEDE AYUDARLO A SENTIRTE MEJOR

Cuando a las personas a quienes se les administró COSENTYX® sus médicos les realizaron una encuesta que medía en qué medida estaba funcionando bien su tratamiento\*, los resultados generales mostraron mejoras en algunos o todos los siguientes síntomas de nr-axSpA y de AS.



**DOLOR TOTAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL**



**RIGIDEZ MATUTINA**



**FATIGA**



**SENSIBILIDAD (ENTESITIS)**



**DOLOR E HINCHAZÓN ARTICULAR**

Asegúrese de hablar **con su reumatólogo sobre COSENTYX** y lo que puede esperar cuando comience.

\* Índice de actividad de la enfermedad de espondilitis anquilosante de Bath.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Infórmele a su médico si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas: enrojecimiento o erupción cutánea, picazón, pequeñas protuberancias o parches, sequedad de la piel que se siente como cuero, ampollas en las manos o los pies que supuran o se vuelven escamosas, o descamación de la piel.

**Los efectos secundarios más frecuentes de COSENTYX incluyen:** síntomas de resfriado, diarrea e infecciones de las vías respiratorias superiores.



Garth recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

¿Necesita ayuda para iniciar la conversación con su médico? **Haga clic aquí** para usar nuestro inicio de conversación con el médico.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de COSENTYX. Llame al médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

#### Antes de usar COSENTYX, informe al médico si:

- Tiene alguna de las afecciones o síntomas de infección mencionados [antes].
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Es alérgico al látex. Las tapas de las agujas de la pluma Sensoready® de COSENTYX y de las jeringas precargadas de 150 mg/ml y 75 mg/0.5 ml contienen látex.
- Ha recibido recientemente o está por recibir una inmunización (vacuna). Las personas tratadas con COSENTYX **no deben** recibir vacunas elaboradas con microbios vivos. Los niños deben estar al día con todas las vacunas antes de comenzar a recibir COSENTYX.
- Tiene cualquier otra afección médica y todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Elabore una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le den un medicamento nuevo.

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos.**

Visite **COSENTYX.com** para obtener más información.

## SENTIRSE CÓMODO CON COSENTYX®

COSENTYX se administra mediante inyección, ya sea con la pluma Sensoready® o con una jeringa precargada. Colabore con su reumatólogo para decidir cuál es el mejor dispositivo para usted\*.

## LA PLUMA SENSOREADY® ES FÁCIL DE USAR

La pluma Sensoready está diseñada para que sea fácil y cómodo usarla. Las personas que utilizaron la pluma Sensoready® en un ensayo clínico la consideraron fácil de usar.

Muy pocas personas en ensayos clínicos (el 2.6 %) experimentaron reacciones en el lugar de la inyección con COSENTYX.†

## COSENTYX SE ADMINISTRA EN UNA CÓMODA DOSIS DE 1 VEZ POR MES\*

La dosis recomendada de COSENTYX para la nr-axSpA y la AS es de 150 mg. Si continúa teniendo síntomas de EA, su reumatólogo puede recetarle 300 mg (administrados en dos inyecciones de 150 mg).

\*Para comenzar, su reumatólogo puede recetarle 5 dosis semanales.

†Resultados del ensayo clínico de nr-axSpA en la semana 52.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si COSENTYX puede dañar al bebé en gestación. Usted y el médico deben decidir si usará COSENTYX.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si COSENTYX pasa a la leche materna.

Le pedimos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de alimentos y medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.



Diseñada para brindar comodidad, la pluma Sensoready ayuda a ocultar la aguja para que ni siquiera tenga que verla.

## RECURSOS SOBRE LAS INYECCIONES



Para obtener apoyo adicional, un miembro del equipo de COSENTYX® Connect está disponible al **1-844-COSENTYX** (1-844-267-3689)

También puede ver nuestros recursos sobre las inyecciones y videos de demostración en [COSENTYX.com/injectiontraining](http://COSENTYX.com/injectiontraining)

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.

## SOPORTE REAL Y SOLUCIONES PERSONALES

**COSENTYX® Connect** es un programa de apoyo personal gratuito que se adapta a sus necesidades desde el principio.

Para los que se les administra COSENTYX®, esto es lo que recibirá una vez que se inscriba:

- **Un miembro del equipo de COSENTYX® Connect**
- **Pagar un copago de tan solo \$0\* si tiene seguro comercial y es elegible de otra forma**
- **Si es elegible, puede obtener hasta 2 años de COSENTYX gratis con el Programa Covered Until You're Covered† si se rechaza su cobertura de seguro mientras se busca la cobertura**
- **Obtenga ayuda para orientarse sobre la cobertura del seguro**
- **Recursos personalizados por correo postal, correo electrónico y actualizaciones por mensaje de texto**
- **Recursos sobre las inyecciones**

Llámenos para obtener más información al **1-844-COSENTYX (1-844-267-3689)** o visite **COSENTYX.com** para obtener más información.

\*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

†El programa **Covered Until You're Covered** está disponible solo para la inyección subcutánea de COSENTYX® (secukinumab). Los pacientes elegibles deben contar con un seguro comercial, una receta válida para COSENTYX y un rechazo de cobertura del seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de la cobertura en el transcurso de los 90 días de la inscripción para conservar la elegibilidad. El programa proporciona COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de la cobertura del seguro, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida de acuerdo con el etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para los pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados en forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otro programa federal o estatal. Es posible que se les solicite a los pacientes que vuelvan a verificar el estado de la cobertura del seguro durante el programa. Sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico; la participación no es una garantía de cobertura del seguro. Se pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos que esperan la cobertura de COSENTYX después de dos años pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, cancelar o enmendar este programa sin aviso previo.

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](http://COSENTYX.com) para obtener más información.



# Cosentyx® Connect

REAL SUPPORT. PERSONAL SOLUTIONS.

## CÓMO OBTENER COBERTURA PARA COSENTYX®

Un miembro del equipo de COSENTYX® Connect trabajará con usted y su proveedor de atención médica para ayudarlo a aprobar su receta de COSENTYX. Vaya a [COSENTYX.com/how-to-get-cosentyx](https://www.cosentyx.com/how-to-get-cosentyx) para ver un recorrido completo de los pasos para recibir COSENTYX.

## RECIBIR COSENTYX

Se le envía COSENTYX desde una farmacia especializada, ya que es un fármaco biológico, lo que significa que requiere un manejo especial y debe refrigerarse.

## CÓMO OBTENER ASISTENCIA FINANCIERA

Si está tiene un seguro comercial, puede ser elegible para pagar tan solo **\$0 de copago\***. El 94 %<sup>1</sup> de los pacientes elegibles que utilizaron el programa en 2022 pagaron \$0 de su bolsillo.

## ¿NECESITA AYUDA PARA ORIENTARSE SOBRE SU COBERTURA?

En el caso poco probable de que su cobertura sea rechazada, haremos todo lo posible para ayudarlo. Obtenga más información sobre nuestro programa Covered Until You're Covered.<sup>†</sup> Si es elegible, el programa ofrece hasta 2 años de COSENTYX gratis si su cobertura no se aprueba inicialmente mientras se busca la cobertura. Para obtener más asistencia con la cobertura, visite [COSENTYX.com/how-to-cosentyx](https://www.cosentyx.com/how-to-cosentyx).



“Mi experiencia fue muy ágil, realmente te guían para todos los pasos que debes seguir”.

**WENDY** PACIENTE REAL

Wendy recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

Si no puede pagar su medicación, Novartis puede posiblemente ayudarlo. Visite [COSENTYX.com/cost](https://www.cosentyx.com/cost) o llame al **1-844-COSENTYX** (1-844-267-3689) para obtener más información.

\*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

<sup>†</sup>El programa Covered Until You're Covered está disponible para la inyección subcutánea de COSENTYX® (secukinumab) únicamente. Los pacientes elegibles deben contar con un seguro comercial, una receta válida para COSENTYX y un rechazo de cobertura del seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de la cobertura en el transcurso de los 90 días de la inscripción para conservar la elegibilidad. El programa proporciona COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de la cobertura del seguro, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida de acuerdo con el etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para los pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados en forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otro programa federal o estatal. Es posible que se les solicite a los pacientes que vuelvan a verificar el estado de la cobertura del seguro durante el programa. Sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico; la participación no es una garantía de cobertura del seguro. Se pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos que esperan la cobertura de COSENTYX después de dos años pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, cancelar o enmendar este programa sin aviso previo.

Consulte la información adicional importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com) para obtener más información.



OBSÉRVAME



Solo para uso de adultos.

**PREGUNTE HOY MISMO A SU  
REUMATÓLOGO SOBRE COSENTYX<sup>®</sup>.**



Visite [COSENTYX.com](https://www.cosentyx.com)



Síganos en X [@COSENTYXUSOnly](https://twitter.com/COSENTYXUSOnly)



Ponga Me gusta en Facebook en [@COSENTYX \(secukinumab\)](https://www.facebook.com/COSENTYX(secukinumab))



Vea historias reales de personas que toman COSENTYX en Instagram en [@cosentyxsecukinumab](https://www.instagram.com/cosentyxsecukinumab)

Consulte la información de seguridad importante que se encuentra en todo el folleto.

Haga clic [aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos.

Referencia: 1. Data on File, Cosentyx NPS Co-pay Data. Novartis Pharmaceuticals Corp; March 2023.



**Novartis Pharmaceuticals Corporation**  
East Hanover, New Jersey 07936-1080

© 2024 Novartis

11/24

FA-11252142