

OBTENGA UN ALIVIO REAL DE LOS DIVERSOS SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA



Jorge es un paciente real y recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

MÍRENME



Cosentyx[®]
(secukinumab)

INDICACIONES

COSENTYX[®] (secukinumab) es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de:

- personas de 6 años o más con psoriasis en placas (PsO) de moderada a grave que afecta grandes o numerosas áreas del cuerpo, y quienes podrían beneficiarse de las inyecciones o de tomar comprimidos (terapia sistémica), o de la fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta [o UV], solo o con terapia sistémica);
- personas de 2 años o más con artritis psoriásica (PsA) activa;
- adultos con espondilitis anquilosante activa (AS);
- adultos con espondiloartritis axial no radiográfica activa (nr-axSpA) y signos objetivos de inflamación;
- personas de 4 años o más con artritis relacionada con entesitis activa (ERA);
- adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use COSENTYX si ha tenido una reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía de medicamentos.

Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía de medicamentos**.

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.



MÍRENME

PERSONAS REALES. ALIVIO REAL.

Para escuchar historias reales de personas que toman COSENTYX[®], visite [COSENTYX.com/RealPsAStories](https://www.cosentyx.com/RealPsAStories)

Este folleto incluye imágenes y testimonios de **pacientes adultos reales** a quienes se les administró COSENTYX y que recibieron una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. COSENTYX podría aumentar el riesgo de que tenga efectos secundarios serios, como:

Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraer infecciones. Algunas personas han tenido infecciones graves mientras tomaban COSENTYX, incluida tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

- Su médico debe realizarle pruebas de TB antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.
- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

TRATAR DIVERSOS SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA

Vivir con artritis psoriásica (PsA) activa puede ser frustrante.

Lidiar constantemente con diversos síntomas de la PsA, como articulaciones dolorosas y sensibles, hinchazón de los dedos de las manos y los pies, y a veces incluso piel escamosa y con picazón, puede convertir sus actividades diarias en desafíos diarios. Y mientras intenta superar el dolor, puede significar que se está perdiendo hacer las cosas que ama.

Es por eso que, si aún tiene dificultades con el dolor articular, las placas cutáneas o cualquiera de los diversos síntomas de la PsA, es importante que tome el control y hable con su reumatólogo para ver si COSENTYX es adecuado para usted.

¿QUÉ ES LA ARTRITIS PSORIÁSICA? 4

ACERCA DE COSENTYX 8

RESULTADOS DE COSENTYX 10

PLUMA SENSOREADY[®] 14

CONSIDERE COSENTYX16

PROGRAMA DE ASISTENCIA PERSONAL COSENTYX[®] CONNECT18

¿Necesita ayuda para iniciar la conversación?

Utilice nuestro Iniciador de conversación con el médico, que se encuentra al **final del folleto**.

Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos**.

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.

¿QUÉ ES LA ARTRITIS PSORIÁSICA?

La artritis psoriásica (PsA) es una afección autoinmunitaria inflamatoria que puede afectar tanto las articulaciones como la piel. Si bien no se conocen por completo las causas específicas de la artritis psoriásica, se cree que hay varias proteínas del sistema inmunitario que pueden tener un rol en la inflamación. Cuando estas proteínas se producen en exceso, causan una respuesta inflamatoria que contribuye al dolor y la hinchazón de las articulaciones y los tendones, y a veces incluso la piel roja, escamosa y con picazón, un síntoma de la psoriasis en placas (PsO).

La PsA es diferente de la artritis reumatoide (AR).

El dolor articular por PsA suele ser asimétrico, lo que significa que el dolor articular no siempre afecta ambos lados del cuerpo.

La inflamación de la AR es periférica, lo que significa que es más probable que afecte las muñecas, las rodillas y los tobillos, y no suele afectar la columna vertebral.



El dolor articular y las placas cutáneas de psoriasis pueden ser síntomas de la misma afección psoriásica que afectan diferentes partes del cuerpo.



En aproximadamente el 85 % de las personas, los síntomas de la piel ocurren antes de la enfermedad articular.



La PsA tiende a afectar a personas de entre 30 y 55 años, pero puede ocurrir antes o después.

PACIENTE REAL **JORGE**

Jorge recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos.

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.

¿CUÁLES SON LOS DIVERSOS SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA?

La artritis psoriásica (PsA) es diferente de otras formas de artritis y afecta a todas las personas de manera diferente.

La misma inflamación que causa dolor articular y placas cutáneas también puede afectar otras partes del cuerpo.

Esta es una lista de los diversos síntomas de la PsA:



Dolor e hinchazón articular, y movilidad física reducida



Entesitis

Dolor y sensibilidad donde los tendones y ligamentos se unen a los huesos, lo que lo hace diferente del "codo de tenista"



Dactilitis

Hinchazón de todo un dedo de la mano o del pie, comúnmente mencionada como "similar a una salchicha"



Placas cutáneas y cambios en las uñas

Frecuentes en personas que también tienen psoriasis en placas




Ayuda a evitar un mayor daño en las articulaciones

En función de los datos de las radiografías

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX, informe al médico si:

- está en tratamiento por una infección;
- tiene una infección que no se cura o que reaparece;
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB;
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como los siguientes: fiebre, sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos; dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel caliente, enrojecida o adolorida, o úlceras en el cuerpo; diarrea o dolor de estómago; ardor al orinar u orinar con mayor frecuencia que la normal



Obtenga más información sobre cómo COSENTYX está orientado al tratamiento de los diversos síntomas de la artritis psoriásica en [COSENTYX.com/PsARealRelief](https://www.cosentyx.com/PsARealRelief).

COSENTYX[®] ES EL PRIMER TRATAMIENTO ORIENTADO A IL-17A

¿QUÉ HACE QUE COSENTYX SEA DIFERENTE?

La PsA (artritis psoriásica) es el resultado de un sistema inmunitario hiperactivo. Si bien no se conocen por completo las causas específicas de la artritis psoriásica, se cree que hay varias proteínas del sistema inmunitario, incluida la IL-17A, que pueden tener un rol en la generación de una inflamación.

COSENTYX es un tipo diferente de producto biológico específico. Es el **medicamento más recetado de su tipo**,*[†] y actúa dentro de su cuerpo para combatir la IL-17A.

*En todas las indicaciones (excepto HS).

†Se desconoce la relación entre cómo actúa COSENTYX en el cuerpo y cómo afecta sus síntomas.

EXPERIENCIA

COSENTYX se ha **estudiado ampliamente durante más de 17 años** en todas las indicaciones. COSENTYX fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) en 2015 para tratar a adultos con psoriasis en placas de moderada a grave. Luego, en 2016, fue aprobado para tratar adultos con artritis psoriásica activa y espondilitis anquilosante activa. Más recientemente, en junio de 2020, fue aprobado por la FDA para tratar otra forma de axSpA: la nr-axSpA.


Se han emitido más de **4 millones de recetas** en los Estados Unidos en todas las indicaciones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Después de que empiece el tratamiento con COSENTYX, llame inmediatamente al médico si tiene cualquiera de los signos de infección mencionados en la página 6. No use COSENTYX si tiene algún síntoma de infección, a menos que se lo indique el médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de COSENTYX?

COSENTYX podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:



"El alivio real significa que el dolor no siempre está en mi mente".

DARREN PACIENTE REAL
 COMENZÓ A TOMAR COSENTYX EN 2016

PERSONAS REALES. ALIVIO REAL.
 VEA SUS HISTORIAS EN
[COSENTYX.com/RealPsAStories](https://www.cosentyx.com/RealPsAStories).

Darren, a la izquierda, recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa**, incluida la **Guía de medicamentos**.

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.

ENCUENTRE ALIVIO REAL DE LA ARTRITIS PSORIÁTICA (PsA)

EL ALIVIO COMIENZA RÁPIDO Y PERDURA



de los pacientes en un ensayo clínico vieron al menos un 20 % de mejoría de los síntomas de PsA a las 16 semanas frente a un 18 % con el placebo.* **Algunos adultos comenzaron a sentir alivio a partir de las 3 semanas.***



Para los pacientes que continuaron con COSENTYX durante 5 años, un porcentaje similar observó una **mejora en los síntomas de la artritis psoriásica.†**



EXPERIENCIA
COSENTYX tiene más de 17 años de experiencia en ensayos clínicos en todas las indicaciones y se han emitido más de **4 millones de recetas‡ en los Estados Unidos.§‡**

*Aproximadamente, el 60 % de los pacientes que recibieron tratamiento con COSENTYX vieron este nivel de mejoría en comparación con el 18 % de los pacientes que recibieron placebo.

†En este estudio, el medicamento que se usa se reveló a médicos y pacientes después de 1 año, lo que podría afectar los resultados.

‡A partir de diciembre de 2023.

§En todas las indicaciones combinadas.

COSENTYX es eficaz sin metotrexato. El reumatólogo puede recetarle COSENTYX con o sin metotrexato.

COSENTYX PUEDE AYUDARLO A DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS PARA QUE PUEDA AVANZAR

Los adultos en los ensayos clínicos completaron un cuestionario donde se preguntaba sobre el grado de dificultad que tenían para completar las actividades cotidianas. **La mayoría de los adultos que tomaron COSENTYX mostraron una mejora general en la capacidad para realizar las actividades diarias a las 16 semanas.** Las preguntas abarcaban categorías como las siguientes:

- Acostarse y levantarse de la cama
- Vestirse sin ayuda
- Caminar
- Usar las manos para comer
- Sujetar objetos
- Alcanzar objetos
- Cuidar la higiene personal

REDUCCIÓN DE LA HINCHAZÓN



En un ensayo clínico, el 50 % de los adultos con dedos de las manos o los pies completamente hinchados ya no tuvieron signos de hinchazón después de 6 meses de tomar COSENTYX, en comparación con el 15 % con placebo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Reacciones alérgicas serias

Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias. Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente si tiene alguno de los síntomas siguientes: sensación de desmayo; hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o sensación de opresión en la garganta o en el pecho; o erupción cutánea o urticaria (protuberancias rojas y con comezón).

Si tiene una reacción alérgica grave, no se aplique otra inyección de COSENTYX.

Enfermedad intestinal inflamatoria

Pueden ocurrir nuevos casos o "exacerbaciones" de la enfermedad intestinal inflamatoria con COSENTYX y a veces pueden ser serios. Si tiene enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), informe al médico si experimenta síntomas de empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento con COSENTYX o si aparecen nuevos síntomas de dolor de estómago o diarrea.

Durante el tratamiento con COSENTYX, pueden producirse **reacciones cutáneas graves que se parecen al eczema**, desde días hasta meses después de la primera dosis, y a veces pueden derivar en una hospitalización. Su médico puede interrumpir temporalmente el tratamiento con COSENTYX si usted desarrolla reacciones cutáneas graves. Infórmele a su médico si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas: enrojecimiento o erupción cutánea, picazón, pequeñas protuberancias o parches, sequedad de la piel que se siente como cuero, ampollas en las manos o los pies que supuran o se vuelven escamosas, o descamación de la piel.


Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos.

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.

COSENTYX[®] TRATA MÁS QUE SOLO EL DOLOR ARTICULAR

AYUDA A DETENER MÁS DAÑOS ARTICULARES.*

Si no se trata, la PsA puede causar daño articular permanente, también conocido como progresión radiográfica. En el ensayo clínico más amplio que se haya realizado para la artritis psoriásica con un fármaco biológico, se demostró que COSENTYX ayuda a detener mayores daños articulares.



El 76 % de los adultos que tomaron COSENTYX no tuvieron aumento en el daño articular a los 6 meses*.

*Para adultos que toman la dosis de 300 mg de COSENTYX. En el grupo de 150 mg, el 71 % de los adultos no tuvo aumento en el daño articular a los 6 meses, frente al 68 % de los adultos que recibieron placebo.

- MENOS DOLOR EN LAS ARTICULACIONES
- MENOS SENSIBILIDAD
- ACLARAMIENTO DE LA PIEL
- PREVENCIÓN DE MÁS DAÑOS ARTICULARES*

Tina recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

* Basado en datos de radiografías de manos y pies a los 6 meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de COSENTYX incluyen: síntomas de resfrío, diarrea e infecciones de las vías respiratorias superiores.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de COSENTYX. Llame al médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Antes de usar COSENTYX, informe al médico si:

- Tiene alguna de las afecciones o síntomas de infección mencionados en la página 6.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Es alérgico al látex. Las tapas de las agujas de la pluma Sensoready[®] de COSENTYX y de las jeringas precargadas de 150 mg/ml y 75 mg/0.5 ml contienen látex.
- Ha recibido recientemente o está por recibir una inmunización (vacuna). Las personas tratadas con COSENTYX **no deben** recibir vacunas elaboradas con microbios vivos. Los niños deben estar al día con todas las vacunas antes de comenzar a recibir COSENTYX.
- Tiene cualquier otra afección médica y todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Elabore una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le den un medicamento nuevo.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si COSENTYX puede dañar al bebé en gestación. Usted y el médico deben decidir si usará COSENTYX.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si COSENTYX pasa a la leche materna.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.



“Lo que me gusta de la pluma Sensoready[®] es que... es tan fácil de usar”.

JONI PACIENTE REAL
COMENZÓ A USAR COSENTYX[®] EN 2016

Joni recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

SIÉNTASE CÓMODO UTILIZANDO COSENTYX

LA PLUMA SENSOREADY ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR COMODIDAD

A los 3 meses, los adultos en un estudio clínico de psoriasis en placa estaban muy satisfechos con **lo fácil que era usar la pluma Sensoready**.

COSENTYX también está disponible en una jeringa precargada. Colabore con su reumatólogo para decidir cuál es el mejor dispositivo para usted.

<1%

MENOS DEL 1 % TUVO REACCIONES EN EL LUGAR DE LA INYECCIÓN

Menos del 1 % de los adultos en ensayos clínicos de artritis psoriásica tuvo reacciones en el lugar de la inyección.



DOSIS CONVENIENTE UNA VEZ AL MES

La dosis recomendada es de 150 mg y se aplica en una inyección debajo de la piel.*

Si tiene psoriasis en placa de moderada a grave o si continúa teniendo síntomas de PsA, su reumatólogo puede recetarle 300 mg (administrados en dos inyecciones de 150 mg).*



RECURSOS SOBRE LAS INYECCIONES

Su profesional de atención médica debe enseñarle cómo inyectar COSENTYX la primera vez para asegurarse de que se sienta cómodo haciéndolo usted mismo. Para una mayor asistencia, un miembro del equipo de COSENTYX[®] Connect está disponible llamando al **1-844-COSENTYX (1-844-267-3689)**

*Para comenzar, su reumatólogo puede recetarle 5 dosis semanales.

Sabemos que las inyecciones pueden ser un desafío para algunas personas. Es por eso que tenemos recursos y herramientas complementarias de capacitación sobre inyecciones para ayudarlo a sentirse más cómodo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Le pedimos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de alimentos y medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.

También puede ver nuestros recursos sobre las inyecciones y videos de demostración en cosentyx.com/all/how-to-inject-cosentyx.

Haga clic aquí para obtener la **Información de prescripción completa, incluida la Guía de medicamentos**.

Visite COSENTYX.com/PsA para obtener más información.


CHARLA REAL DE PERSONAS REALES QUE TOMAN COSENTYX[®]

Quando tenga preguntas, ¡no espere para hacerlas! Presentamos **REAL TALK**, una nueva serie de videos que aborda las preguntas de la vida real al presentar conversaciones genuinas entre personas que reciben COSENTYX y la **Dra. Elizabeth Perkins**, reumatóloga en ejercicio.

La Dra. Perkins recibió una compensación por su tiempo.



Recuerde que su médico es su mejor recurso, así que pregunte sobre COSENTYX hoy mismo. Comience a ver los videos en [COSENTYX.com/PsARealTalk](https://www.cosentyx.com/PsARealTalk)



"Recibí alivio del dolor y la hinchazón en las manos".

TINA PACIENTE REAL

COMENZÓ A RECIBIR COSENTYX EN 2016

PERSONAS REALES. ALIVIO REAL. VEA SUS HISTORIAS EN [COSENTYX.com/RealPsAStories](https://www.cosentyx.com/RealPsAStories).

Tina recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.



APOYO DESDE EL COMIENZO

Inscríbese en COSENTYX® Connect y comience a aprovechar estas excelentes herramientas, recursos y ofertas.



Un miembro del equipo de COSENTYX® Connect



Pague un copago de tan solo \$0 si tiene seguro comercial y es elegible de otra forma*

CUBIERTO
hasta que esté
CUBIERTO

Los pacientes elegibles asegurados comercialmente pueden recibir hasta **2 años de medicamentos gratuitos** si el seguro no se aprueba inicialmente, mientras usted trabaja con su plan de salud comercial para garantizar la cobertura de COSENTYX®†



Un kit de bienvenida con herramientas, bolso de viaje y recursos para ayudarlo a comenzar



Un recipiente reciclable para objetos punzocortantes



Recursos sobre las inyecciones



Asistencia y recursos personalizados por correo postal, correo electrónico y mensaje de texto

LE BRINDAMOS COBERTURA

Si no puede pagar su medicación, Novartis puede ayudarlo. Visite [COSENTYX.com/cost](https://www.cosentyx.com/cost) o llame al 1-844-COSENTYX (1-844-267-3689) para obtener más información.

*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

†El programa **Covered Until You're Covered** está disponible para la inyección subcutánea de COSENTYX® (secukinumab) únicamente. Los pacientes elegibles deben contar con un seguro comercial, una receta válida para COSENTYX y un rechazo de cobertura del seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de la cobertura en el transcurso de los 90 días de la inscripción para conservar la elegibilidad. El programa proporciona COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de la cobertura del seguro, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida de acuerdo con el etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para los pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados en forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otro programa federal o estatal. Es posible que se les solicite a los pacientes que vuelvan a verificar el estado de la cobertura del seguro durante el programa. Sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico; la participación no es una garantía de cobertura del seguro. Se pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos que esperan la cobertura de COSENTYX después de dos años pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, cancelar o enmendar este programa sin aviso previo.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/PsA](https://www.cosentyx.com/PsA) para obtener más información.



Cosentyx[®]
(secukinumab)



Jorge es un paciente real y recibió una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

MÍRENME

PERSONAS REALES. ALIVIO REAL. VEA SUS HISTORIAS EN [COSENTYX.com/RealPsAStories](https://www.cosentyx.com/RealPsAStories).

PREGUNTE HOY MISMO A SU REUMATÓLOGO SOBRE COSENTYX[®]



Síguenos en X [@COSENTYXUSOnly](https://twitter.com/COSENTYXUSOnly)



Escuche historias reales de personas reales que toman COSENTYX en [YouTube.com/COSENTYX](https://www.youtube.com/COSENTYX) y [COSENTYX.com/PsARealTalk](https://www.cosentyx.com/PsARealTalk)

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

 **NOVARTIS**

Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080